

FICHA METODOLÓGICA DE INDICADOR

A. ASPECTOS PARA IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

A.1 Nombre del indicador:	Prevalencia de desnutrición crónica en niñas/os menores de 5 años
A.2 Definición:	Número de niñas/os menores de 5 años que presentan desnutrición crónica, expresado como porcentaje de la población total de ese grupo de edad, en un periodo (t) determinado.

B. ASPECTOS METODOLÓGICOS

B.1 Fórmula de cálculo:

$$PDC_{<5}^t = \frac{NDC_{<5}^t}{TN_{<5}^t} * 100$$

Donde:

$PDC_{<5}^t =$	Prevalencia de desnutrición crónica en niñas/os menores de 5 años, en un periodo (t) determinado.
$NDC_{<5}^t =$	Número de niñas/os menores de 5 años de edad que presentan desnutrición crónica, en un periodo (t) determinado.
$TN_{<5}^t =$	Total de niñas/os menores de 5 años de edad, en un periodo (t) determinado.

B.2 Definiciones relacionadas con el indicador:

- Desnutrición.-** Resultado de una ingesta nutricional deficiente en cantidad y/o calidad, o de absorción y/o uso biológico deficientes de los nutrientes consumidos como resultado de casos repetidos de enfermedades. La desnutrición comprenden la insuficiencia ponderal en relación con la edad, la estatura demasiado baja para la edad (retraso de crecimiento), la delgadez peligrosa en relación con la estatura (emaciación) y el déficit de vitaminas y minerales (malnutrición por carencia de micronutrientes) (Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud(OMS), 2018, pág. 171).
- Retraso del crecimiento o talla insuficiente respecto a la edad.-** Es la consecuencia de una desnutrición crónica, generalmente asociada a condiciones socioeconómicas deficientes, mala salud y nutrición materna, enfermedades frecuentes y/o alimentación y cuidado inadecuados de lactantes y niños pequeños en los primeros años de vida. El retraso del crecimiento impide que los niños desarrollen plenamente su potencial físico y cognitivo (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021).
- Desnutrición crónica.-** Es la presencia de un retraso en su crecimiento, que se mide comparando la talla del niño o la niña con el estándar recomendado para su edad según curvas de crecimiento universales durante una atención médica o visita domiciliaria. Además indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que aumenta el riesgo de que contraiga

enfermedades y afecta al desarrollo físico e intelectual del niño o niña (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2011).

4. **Longitud/talla.**- El estándar de crecimiento lineal tiene una parte basada en la longitud (longitud para la edad, 0 a 24 meses) y otro de talla (talla para la edad, de 2 a 5 años) (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2006, pág. xviii). Para todos los indicadores que incluyen longitud o talla, la longitud acostada debe ser usada para niños menores de 24 meses y talla parada, para niños de 24 meses y mayores (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2007, pág. 3). El indicador se mide en centímetros (cm).
5. **Puntajes z antropométricos.**- Describen qué tan lejos y en qué dirección está la medición de un individuo del valor medio de las poblaciones de referencia. Para los patrones de crecimiento de la OMS, la población de referencia son los niños del mismo sexo y edad (dependiendo de la medida). Los puntajes Z que caen fuera del rango normal indican un problema nutricional (desnutrición o sobrepeso). Cuanto más lejos del rango normal, más grave es el problema nutricional (Cashin & Oot, 2018, pág. 16). En este sentido, las puntuaciones z se expresan en unidades de desviaciones estándar con respecto a la media para el sexo, edad, peso y estatura (Casanueva, Kaufer, Pérez, & Arroyo, 2008, pág. 279).

B.3 Metodología de cálculo:

El indicador se calcula a partir de:

1. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2012)¹
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-salud-reproductiva-y-nutricion-ensanut-2012/>
2. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV - 2014)¹
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/
3. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2018)¹
<https://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-salud-reproductiva-y-nutricion/>
4. Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI)

Para ejemplificar la metodología de cálculo del indicador, a continuación se detalla el formulario, sección(es) y pregunta(s) de la ENDI que intervienen en el proceso de estimación de la métrica. Es importante señalar que las variables relacionadas (preguntas) pueden ser encontradas en cada una de las fuentes de información anteriormente enunciadas.

ENDI - Formulario Nro. 1 del Hogar:

- Sección antropometría:

¹ La ENSANUT 2012, ECV 2014 y ENSANUT 2018 cuentan con la información necesaria para replicar el presente indicador, sin embargo, el procedimiento descrito podría variar en función de la metodología de levantamiento de la fuente, el registro de datos en la base, entre otros temas.

¿En qué fecha NACIÓ (...)?			Registre la fecha de la MEDICIÓN de (...)			La LONGITUD de (...)			La TALLA de (...)		
						Registrar la longitud en cm. menores de 2 años Si la diferencia entre Longitud 1 y Longitud 2 es mayor a ± 0.5 cm., realizar toma de la Longitud 3 CONTINUE CON LA SIGUIENTE SECCIÓN			Registrar la talla en cm. 2 años y más Si la diferencia entre Talla 1 y Talla 2 es mayor a ± 0.5 cm., realizar la toma de la Talla 3 CONTINUE CON LA SIGUIENTE SECCIÓN		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	Long. 1	Long. 2	Long. 3	Talla 1	Talla 2	Talla 3
2			3			5			6		

Para establecer el numerador se considera el siguiente proceso:

1. Calcular la edad de las niñas/os, en días, a través de la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha en la que se realizó la medición de la talla/longitud en centímetros (cm).
2. Validar las medidas de longitud y talla, para lo cual es importante conocer que durante el operativo de campo se realizan dos mediciones y en el caso que el antropometrista note una diferencia mayor de ± 0.5 cm entre ellas, se toma una tercera medición.

La longitud/talla final de las niñas/os es la media entre las dos primeras mediciones; en caso de contar con una tercera toma, la longitud/talla corresponderá al promedio entre las dos mediciones más cercanas.

3. Una vez calculadas las variables longitud/talla y edad, se procede a estandarizar el valor de "longitud/talla para la edad" en función al sexo, con base a los estándares de crecimiento infantil de la OMS².
4. En este procedimiento se eliminan los valores extremos que están fuera del intervalo de -6.0 y +6.0 desviaciones estándar (DE), ver tabla 1.

Tabla 1. Valores plausibles de los indicadores antropométricos en niñas/os menores de 5 años de edad

Criterios o variables antropométricas	Intervalo de puntuaciones z incluidos	Indicador	Puntajes Z o DE
Longitud/talla para la edad	De -6.0 a +6.0	Con Desnutrición Crónica	De [-6.0 a -2.0]
		Sin Desnutrición Crónica	De [-2.0 a +6.0]

Fuente: Adaptado del Manual WHO Anthro³ (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2007)

5. Finalmente, el numerador considerará a aquellas niñas/os menores de 5 años (1826 días) de edad con un puntaje Z mayor o igual a -6.0 y menor a -2.0.

Para determinar el denominador se considera:

La población de niñas/os menores de 5 años (1826 días) de edad con un puntaje Z de -6.0 a +6.0.

² Estándares de crecimiento (<https://www.who.int/publications/i/item/924154693X>) y gráficos de las puntuaciones Z por grupos de edad y sexo (<https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/length-height-for-age>).

³ Manual WHO Anthro para computadoras personales (<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Manual-Who-Anthro-compu.pdf>)

Para el resultado final: Se divide la población de niñas/os menores de 5 años (1826 días) de edad con un puntaje Z mayor o igual a -6.0 y menor a -2.0 para el total de la población de niñas/os menores de 5 años (1826 días) de edad con un puntaje Z de -6.0 a +6.0, finalmente el resultado se expresa en porcentaje.			
B.4 Limitaciones técnicas: 1. En las encuestas previas al año 2012, únicamente se registraba una sola medición para el peso y la longitud/talla, por lo tanto no se puede aplicar la metodología de las tres mediciones.			
B.5 Interpretación del indicador:		Para el periodo (t), XX de cada 100 niñas/os menores de 5 años de edad presentan desnutrición crónica.	
B.6 Unidad de medida:	B.7 Periodicidad del indicador:	B.8 Disponibilidad de los datos:	B.9 Información Geo referenciada:
Porcentaje	Anual ⁴	2012, 2014, 2018, jul2022-jul2023	Sí <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> (Ver anexo 1)
B.10 Niveles de desagregación⁵:			
Geográfico	Socio demográfico/ económico		Otros ámbitos
1. Nacional	1. Sexo (Hombre y Mujer)		
2. Área (Urbana y Rural)			
3. Región Natural			
4. Provincial			
B.11 Fuente/s de información:			
Institución generadora	Tipo	Nombre	
1. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	1. Encuesta	1. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-2012).	
2. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	2. Encuesta	2. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-2014).	
3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	3. Encuesta	3. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-2018).	
4. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	4. Encuesta	4. Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI)	
C. RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL			
C.1 Agendas y/o compromisos nacionales e internacionales a los que alimenta			
Instrumento	Descripción		

⁴ A partir del año 2023.

⁵ La variable de diseño de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) es la “desnutrición crónica en niñas/os menores de 5 años”; por tanto, esta variable podrá ser desagregada por área, región natural, provincia y sexo. Para declarar estos u otros niveles de desagregación en las distintas métricas calculadas a partir de la encuesta, se sugiere analizar estadísticos como el “coeficiente de variación”, “tamaño de la muestra” e “intervalos de confianza”.

1. Agenda de Desarrollo 2030-Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	<p>Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.</p> <p>Meta 2.2: Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad</p> <p>Indicador 2.2.1: Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años.</p>
2. Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 (PND).	<p>Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad.</p> <p>Política 6.4: Combatir toda forma de malnutrición, con énfasis en la DCI</p> <p>Meta 6.4.1: Reducir 6 puntos porcentuales la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 2 años.</p>
3. Decreto Presidencial Nro.1211 "Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición", de 15 de diciembre de 2020.	<p>Artículo 1: Aprobar la implementación de la "Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil⁶" cuyo objetivo es prevenir la desnutrición crónica infantil y reducir su prevalencia en niños y niñas menores de 24 meses de edad, conforme los objetivos planteados en la agenda 2030, a través de la implementación del denominado "Paquete Priorizado" de bienes y servicios destinado a atender a la población objetivo que será monitoreada nominalmente, y cuya asignación presupuestaria se garantiza con la aplicación de la metodología de "Presupuesto por Resultados", estableciéndose adicionalmente, el calendario estadístico, la obligatoriedad de medición de la tasa de desnutrición crónica infantil mediante una operación estadística por muestreo y de forma anual misma que será ejecutada por la entidad responsable de Estadística y Censos a nivel nacional.</p>
C.2 Comparabilidad internacional:	<input checked="" type="radio"/> Marco internacional <input type="radio"/> Proxy <input type="radio"/> Complementario <input type="radio"/> No aplica
C.3 Organismo internacional custodio:	United Nations Children's Fund (UNICEF) World Health Organization (WHO) World Bank (WB)
D. OTRAS CONSIDERACIONES	
D.1 Clasificador Temático estadístico:	1.4 Salud

⁶ Presidencia de la República del Ecuador. 2022. Decreto Ejecutivo Nro. 404 del 21 de abril de 2022, Artículo 2. Registro Oficial Nro. 57 de 06 de mayo de 2022.

D.2 Institución responsable del cálculo del indicador:	Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)	Área Técnica	Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES)
D.3 Fecha de transferencia de la información:			
D.4 URL/ Link de publicación de serie de datos:	https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/		
D.5 Referencias bibliográficas:	<p>Casanueva, E., Kaufer, M., Pérez, A. B., & Arroyo, P. (2008). <i>Nutriología Médica</i>. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=ZjcGp1su-IUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false</p> <p>Cashin, K., & Oot, L. (2018). <i>Guide to Anthropometry: A Practical Tool for Program Planners, Managers, and Implementers</i>. Washington, DC. Obtenido de https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/FA-NTA-Anthropometry-Guide-May2018.pdf</p> <p>Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). <i>El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo</i>. Roma: Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Obtenido de https://books.google.com.ec/books?id=vE5uDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false</p> <p>Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2011). <i>La desnutrición infantil - Causa, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento</i>. Obtenido de https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2016/09/Dossierdesnutricion.pdf</p> <p>Organización Mundial de la Salud (OMS). (2006). <i>WHO Child Growth Standards</i>. Obtenido de https://www.who.int/publications-detail-redirect/924154693X</p> <p>Organización Mundial de la Salud (OMS). (2007). <i>Manual WHO Anthro para computadoras personas</i>. Obtenido de https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Manual-Who-Anthro-compu.pdf</p> <p>Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). <i>Malnutrition</i>. Obtenido de https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition</p>		
D.6 Cronología del indicador:	<p>El 08 de mayo de 2014 se elaboró la primera versión del presente indicador, denominado "Tasa de desnutrición crónica para niños menores de 5 años de edad". El 04 de mayo de 2015, la Comisión Especial de Estadística de Salud actualizó el indicador en mención y,</p>		

	<p>posteriormente, el 07 de mayo de 2015, mediante resolución CEES 006-2015, homologó el cálculo de las tasas de desnutrición crónica, aguda y global para niños menores de 5 años de edad.</p> <p>El 14 de septiembre de 2016, la Comisión Especial de Estadística de Salud, con resolución CEES 010-2016, actualizo y homologo el indicador anteriormente descrito bajo el nombre de “Prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años”. A partir de esta métrica, homologada con sintaxis desarrollada en STATA para el procesamiento de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV – 2014), se ha actualizado el documento ajustando la sintaxis de cálculo a la nueva fuente de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En diciembre de 2019 la sintaxis fue ajustada para la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT – 2018). • El 03 de febrero de 2020 se incorporó la sintaxis correspondientes a la ENSANUT – 2012, ECV – 2014 y ENSANUT 2018. <p>Durante el año 2022-2023, la Comisión Especial de Estadística de Salud inicio la construcción, fortalecimiento y/o actualización de los principales indicadores sobre Desnutrición Infantil; como parte de este proceso se fortalecieron las definiciones relacionadas, metodología de cálculo, sintaxis de cálculo en software libre, entre otros aspectos de la presente métrica.</p>
D.7 Fecha de aprobación de la ficha:	07 de mayo de 2015
D.8 Fecha de la última actualización:	16 de junio de 2023
D.9 Ficha elaborada por:	<p>Comisión Especial de Estadística de Salud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) - Vicepresidencia de la República (VPR) - Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) - Ministerio de Salud Pública (MSP) - Secretaría Nacional de Planificación (SNP) - Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (STECSDI)
D10. Sintaxis del Indicador:	
<p># Título de la Sintaxis: # Prevalencia de desnutrición crónica en niñas/os menores de 5 años</p> <p># Operación Estadística: # Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI 2022 - 2023)</p> <p># Autor de la Sintaxis: # Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) # Dirección Técnica: # Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) # Gestión Interna: # Gestión de Estadísticas Permanentes a Hogares (GEPH)</p>	

```
# Fecha de elaboración: 15/02/2023
# Fecha de actualización: 12/06/2023
```

```
# Versión: 1.0
# Software: R 4.2.0
```

```
#=====#
####          Instalación y carga de paquetes          #####
#=====#
```

```
# Se usa la función p_load() desde el paquete pacman, el cual instala
# el paquete si está ausente, y carga para el uso si ya está instalado
```

```
# Se asegura que el paquete "pacman" este instalado
if(!require("pacman")) install.packages("pacman")
```

```
# Paquetes disponibles desde CRAN
```

```
pacman::p_load(
```

```
  # Gestión de proyectos y archivos
  here, # construye rutas a los archivos de su proyecto
  rio, # importación / exportación de varios tipos de datos
  expss, # tablas, etiquetas y funciones de hojas de cálculo y estadísticas de 'SPSS'
```

```
  # Instalación y manejo de paquetes
  pacman, # instalar y cargar paquetes
```

```
  # Manejo general de los datos
  tidyverse, # incluye paquetes para ordenar y presentar los datos
  lubridate, # trabaja con fechas
  pillar, # herramientas para manejar columnas de datos
  janitor, # Limpieza de datos y tablas
  sjlabelled, # para tratar etiquetas
  epikit, # agregar categorías
```

```
  # Estadísticas
  summarytools, # herramientas para resumir datos de forma rápida y ordenada
```

```
  # Manejo de muestras complejas
  srvyr, # estadística de resumen para datos de encuestas
```

```
  # Paquetes para cálculos específicos
  anthro # cálculo de puntuaciones z de antropometría infantil
```

```
)
```

```
# Limpieza del espacio de trabajo
rm(list = ls(all = TRUE))
```

```
#=====#
####          Funciones          #####
#=====#
```

```
# Función para calcular estadísticos para variables dicotómicas
srvyr_prop <- function(design, x) {
```

```
  design %>%
  summarise(
```



```

    props = survey_mean({{ x }},
                        proportion = TRUE,
                        vartype = c("se", "ci", "cv"),
                        na.rm = T) * 100,
    deff = survey_mean({{ x }},
                      deff = "replace",
                      na.rm = T),
    Num = sum({{ x }}, na.rm = TRUE),
    Deno = sum(!is.na({{ x }})) %>%
mutate(desag = "Nacional") %>%
select(
  Desag = desag,
  Props = props,
  EE   = props_se,
  LI   = props_low,
  LS   = props_upp,
  CV   = props_cv,
  Deff = deff_deff,
  Num  = Num,
  Deno = Deno
)

```

```

}

```

Función para calcular estadísticos para variables dicotómicas

por desagregación

```

srvyr_prop_by <- function(design, x, by) {

```

```

  design %>%
  group_by({{ by }}) %>%
  summarise(
    props = survey_mean({{ x }},
                        proportion = TRUE,
                        vartype = c("se", "ci", "cv"),
                        na.rm = T) * 100,
    deff = survey_mean({{ x }},
                      deff = "replace",
                      na.rm = T),
    Num = sum({{ x }}, na.rm = TRUE),
    Deno = sum(!is.na({{ x }})) %>%
mutate(desag = {{ by }}) %>%
select(
  Desag = desag,
  Props = props,
  EE   = props_se,
  LI   = props_low,
  LS   = props_upp,
  CV   = props_cv,
  Deff = deff_deff,
  Num  = Num,
  Deno = Deno
)

```

```

}

```

```

#=====#
####          Carga de base de datos          #####
#=====#

```

Indicaciones:

```

# 1. Se proporciona la ruta de archivo absoluta o completa en la función import
# entre comilla.
# 2. Use barras diagonales ( / ). Este no es el valor predeterminado para las
# rutas de archivos de Windows

# Ejemplo:
df_f1_personas <- import("C:/ENDI/Data/f1_personas.rds")

# Sugerencias:

# Es probable que R no reconozca las rutas de archivos que comienzan con barras
# inclinadas dobles (p. ej., "//...") y produzcan un error. Considere mover
# su trabajo a una unidad "con nombre" o "con letras" (p. ej., "C:" o "D:").

# Base personas
df_f1_personas <- import("")
df_f1_personas <- as_tibble(df_f1_personas)
df_f1_personas

# Diccionario de variables
# Cargar el archivo: Diccionario_ENDI.xlsx con la hoja ya especificada
dicc_f1_per <- import("",
                      which = "f1_personas")

dicc_f1_per <- as_tibble(dicc_f1_per)
dicc_f1_per

#=====#
####  Cálculo de variables antropométricas necesarias para el indicador  ####
#=====#

# Estimación de la edad en días -----#

df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(dob = paste(f1_s5_2_3, f1_s5_2_2, f1_s5_2_1)) %>%
  mutate(dov = paste(f1_s5_3_3, f1_s5_3_2, f1_s5_3_1)) %>%
  mutate(dob = as_date(dob)) %>%
  mutate(dov = as_date(dov)) %>%
  mutate(edaddias = (dob %--% dov) / days(1)) %>%
  mutate(edadmeses = trunc((dob %--% dov) / months(1))) %>%
  mutate(edadanios = trunc((dob %--% dov) / years(1)))

df_f1_personas %>%
  descr(edaddias,
        stats = c("common"),
        round.digits = 2)

# Estimación del peso (kg) -----#

# Validación de las 3 medidas del peso
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(aux_peso = abs(f1_s5_4_1 - f1_s5_4_2))

df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(f1_s5_4_3 = case_when(
    aux_peso <= 0.5 & !is.na(f1_s5_4_3) ~ NA_real_,
    TRUE ~ f1_s5_4_3
  ))

```

```

# Se calcula el peso en kg
# Distancia entre las tres medidas
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(d1 = abs(f1_s5_4_1 - f1_s5_4_2)) %>%
  mutate(d2 = abs(f1_s5_4_1 - f1_s5_4_3)) %>%
  mutate(d3 = abs(f1_s5_4_2 - f1_s5_4_3))

# Variable identificador
# Distancia entre toma 1 y toma 2 es menor o igual a 0.5
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(s = case_when(
    d1 <= 0.5 ~ 1,
    d1 > 0.5 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

# Promedio simple entre toma 1 y toma 2
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(peso = case_when(
    s == 1 ~ (f1_s5_4_1 + f1_s5_4_2) / 2,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

df_f1_personas %>%
  descr(peso,
    stats = c("common"),
    round.digits = 2)

# Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
# Distancia mínima
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(dmin = case_when(
    (d1 <= d2 & d1 <= d3) |
    (!is.na(d1) & is.na(d2) & is.na(d3)) ~ d1,
    (d2 <= d1 & d2 <= d3) |
    (!is.na(d2) & is.na(d1) & is.na(d3)) ~ d2,
    (d3 <= d1 & d3 <= d2) |
    (!is.na(d3) & is.na(d1) & is.na(d2)) ~ d3,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(peso = case_when(
    d3 == dmin ~ (f1_s5_4_2 + f1_s5_4_3) / 2,
    d2 == dmin ~ (f1_s5_4_1 + f1_s5_4_3) / 2,
    d1 == dmin ~ (f1_s5_4_1 + f1_s5_4_2) / 2,
    TRUE ~ peso
  ))

df_f1_personas %>%
  descr(peso,
    stats = c("common"),
    round.digits = 2)

# Estimación de la talla (cm) -----#

# Validación de las 3 medidas de la longitud
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(aux_long = abs(f1_s5_5_1 - f1_s5_5_2))

```

```

df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(f1_s5_5_3 = case_when(
    aux_long <= 0.5 & !is.na(f1_s5_5_3) ~ NA_real_,
    TRUE ~ f1_s5_5_3
  ))

# Validación de las 3 medidas de la talla
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(aux_tal = abs(f1_s5_6_1 - f1_s5_6_2))

df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(f1_s5_6_3 = case_when(
    aux_tal <= 0.5 & !is.na(f1_s5_6_3) ~ NA_real_,
    TRUE ~ f1_s5_6_3
  ))

# Se calcula la talla en cm.
# Consolido las tomas para longitud y talla

# Talla 1
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(talla1 = case_when(
    is.na(f1_s5_5_1) & !is.na(f1_s5_6_1) ~ f1_s5_6_1,
    !is.na(f1_s5_5_1) & is.na(f1_s5_6_1) ~ f1_s5_5_1,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

# Talla 2
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(talla2 = case_when(
    is.na(f1_s5_5_2) & !is.na(f1_s5_6_2) ~ f1_s5_6_2,
    !is.na(f1_s5_5_2) & is.na(f1_s5_6_2) ~ f1_s5_5_2,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

# Talla 3
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(talla3 = case_when(
    is.na(f1_s5_5_3) & !is.na(f1_s5_6_3) ~ f1_s5_6_3,
    !is.na(f1_s5_5_3) & is.na(f1_s5_6_3) ~ f1_s5_5_3,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

# Distancia entre las tres medidas
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(d1_tal = abs(talla1 - talla2)) %>%
  mutate(d2_tal = abs(talla1 - talla3)) %>%
  mutate(d3_tal = abs(talla2 - talla3))

# Variable identificador
# Distancia entre toma 1 y toma 2 es menor o igual a 0.5
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(s_tal = case_when(
    d1_tal <= 0.5 ~ 1,
    d1_tal > 0.5 ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

# Promedio simple entre toma 1 y toma 2
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%

```

```

mutate(talla = case_when(
  s_tal == 1 ~ (talla1 + talla2) / 2,
  TRUE ~ NA_real_
))

df_f1_personas %>%
  descr(talla,
    stats = c("common"),
    round.digits = 2)

# Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
# Distancia mínima
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(dmin_tal = case_when(
    (d1_tal <= d2_tal & d1_tal <= d3_tal) |
    (!is.na(d1_tal) & is.na(d2_tal) & is.na(d3_tal)) ~ d1_tal,
    (d2_tal <= d1_tal & d2_tal <= d3_tal) |
    (!is.na(d2_tal) & is.na(d1_tal) & is.na(d3_tal)) ~ d2_tal,
    (d3_tal <= d1_tal & d3_tal <= d2_tal) |
    (!is.na(d3_tal) & is.na(d1_tal) & is.na(d2_tal)) ~ d3_tal,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(talla = case_when(
    d3_tal == dmin_tal ~ (talla2 + talla3) / 2,
    d2_tal == dmin_tal ~ (talla1 + talla3) / 2,
    d1_tal == dmin_tal ~ (talla1 + talla2) / 2,
    TRUE ~ talla
  ))

df_f1_personas %>%
  descr(talla,
    stats = c("common"),
    round.digits = 2)

# Sexo -----#

df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(sexo = unlabel(f1_s1_2))

df_f1_personas %>%
  freq(sexo, cumul = F)

#=====#
####      Cálculo de puntuaciones z de antropometría infantil      ####
#=====#

# Valoración de los z-scores
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(anthro_zscores(
    sex = sexo,
    age = edaddias,
    weight = peso,
    lenhei = talla
  ))

#=====#
####      Construcción de las variables de desnutrición con los z-score      ####
#=====#

```

```

# Desnutrición crónica para menores de 5 años de edad -----#

# Definición de la edad en días de la población menor a 5 años:
# Días = 365.25 * 5 = 1826.25 ----> 1826 (valor aproximado) (Manual Anthro OMS)

# Indicador
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(dcronica = case_when(
    (zlen >= -6 & zlen < -2) & (edaddias < 1826 & !is.na(edaddias)) ~ 1,
    (zlen >= -2 & zlen <= 6) & (edaddias < 1826 & !is.na(edaddias)) ~ 0,
    TRUE ~ NA_real_
  ))

df_f1_personas %>%
  freq(dcronica, cumul = F, report.nas = F)

#=====#
####          Desagregación          #####
#=====#

# Para establecer las etiquetas como valores
# Área
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(area = as_label(area))

df_f1_personas %>%
  freq(area, cumul = F, report.nas = F)

# Región
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(region = as_label(region))

df_f1_personas %>%
  freq(region, cumul = F, report.nas = F)

# Provincia
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(prov = as_label(prov))

df_f1_personas %>%
  freq(prov, cumul = F, report.nas = F)

# Sexo
df_f1_personas <- df_f1_personas %>%
  mutate(f1_s1_2 = as_label(f1_s1_2))

df_f1_personas %>%
  freq(f1_s1_2, cumul = F, report.nas = F)

#=====#
####          Declaración de encuesta          #####
#=====#

survey_design <- df_f1_personas %>% as_survey_design(ids = "id_upm",
  strata = "estrato",
  weights = "fexp")
options(survey.lonely.psu = "adjust")

#=====#

```

```

####      Resultados ponderados      ####
#=====#

# Desnutrición crónica
# Menores de 5
survey_design %>%
  srvyr_prop(dcronica)

# Área
survey_design %>%
  srvyr_prop_by(dcronica, area)

# Región
survey_design %>%
  srvyr_prop_by(dcronica, region)

# Provincia
survey_design %>%
  srvyr_prop_by(dcronica, prov)

# Sexo
survey_design %>%
  srvyr_prop_by(dcronica, f1_s1_2)

```

ANEXOS	
Anexo 1. Detalle de la georreferenciación del indicador:	No aplica
Anexo 2: Sintaxis para los años 2012, 2014 y 2018	
<pre> # Desnutrición crónica 2012, 2014 y 2018 ----- # Operaciones Estadísticas: # 1. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2012) # https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-salud-reproductiva-y-nutricion-ensanut-2012/ # 2. Encuesta de Condiciones de Vida (ECV - 2014) / Base de Datos / Base Primaria # https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/ # 3. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2018) # https://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-salud-reproductiva-y-nutricion/ # Autor de la sintaxis: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) # Dirección Técnica: Dirección de Estadísticas Sociodemográficas (DIES) # Gestión interna: Gestión de Estadísticas Permanentes a Hogares # Nota: La Dirección de Planificación Estadística del SEN (DIPSEN) estructuró y modificó la sintaxis en # STATA (anteriores fichas metodológicas) y R desarrollada por DIES, para replicar las cifras del # "Retraso en el crecimiento (Desnutrición crónica)" para los años 2012, 2014 y 2018. # Fecha de elaboración: 28/09/2016 (sintaxis STATA) # Fecha de actualización: 12/06/2023 (sintaxis R) # Versión sintaxis: 1.0 # Software: R 4.2.0 </pre>	

```
# Instrucciones -----
# 1. Descargar las bases de datos que se encuentran publicadas en los links antes indicados.
#
# 2. Importar las bases de personas y, para el año 2012, la base de antropometría
# La sintaxis está construida para reconocer las bases de datos de:
# - Ensanut 2012 y 2018 en formato .dta
# - ECV 2014 en formato .sav
#
# 3. Guardar las bases en un directorio y asignar la dirección en "dir".
# Ejemplo:
# dir <- "C:/Users/User1/Documents/BDD"
#
# 4. Asignar el "año" correspondiente de la base
# Ejemplo:
# año <- "2018"
#
# 5. Correr la programación en R.
```

```
# Entorno de trabajo -----
rm(list=ls())
```

```
#Carga de librerías previamente instaladas
```

```
library("tidyverse")
```

```
library("srvyr")
```

```
library("anthro")
```

```
library("lubridate")
```

```
#Valores fuera de la base de datos requeridos: -----
```

```
dir <- "D:/INEC/BDD" #Escriba aquí la ruta de las bases
```

```
año <- 2012 #Año de la base
```

```
# Base personas -----
```

```
if(año==2012) {
  library("readstata13")
  per <- read.dta13(paste0(dir, "/ensanut_f1_personas.dta"),
    convert.factors = FALSE,
    select.cols = c(
      "idpers", #Identificador de personas
      "idmadre", #Identificador de la madre
      "pd04c", #Fecha de nacimiento: año
      "pd04b", #Fecha de nacimiento: mes
      "pd04a", #Fecha de nacimiento: día
      "anio", #Fecha encuesta: año
      "mes", #Fecha encuesta: mes
      "dia", #Fecha encuesta: día
      "prov",
      "gr_etn", #Autoidentificación
      "area"
    )
  )
}
```

```
antro <- read.dta13(paste0(dir, "/ensanut_f10_antropometria.dta"),
```



```

      convert.factors = FALSE,
      select.cols = c(
        "idpers", #Identificador de personas
        "f10sexo", #Sexo de la niña/o
        "peso1", #Peso 1
        "peso2", #Peso 2
        "peso3", #Peso 3
        "long1", #Longitud 1
        "long2", #Longitud 2
        "long3", #Longitud 3
        "talla1", #Talla 1
        "talla2", #Talla 2
        "talla3", #Talla 3
        "pw", #Factor de Expansión
        "idsector" #Unidad Primaria de Muestreo
      )) %>%
mutate(across(c(peso1, peso2, peso3,
  long1, long2, long3,
  talla1, talla2, talla3), ~na_if(., 999)))

bdd <- left_join(antro, per, by="idpers") %>% #Unión de BDD
rename( #Cambio de nombres a versión Ensanut 2018
  f1_s7_2_3=pd04c,
  f1_s7_2_2=pd04b,
  f1_s7_2_1=pd04a,
  f1_s7_3_3=anio,
  f1_s7_3_2=mes,
  f1_s7_3_1=dia,
  sexo=f10sexo,
  f1_s7_4_1=peso1,
  f1_s7_4_2=peso2,
  f1_s7_4_3=peso3,
  f1_s7_5_1=long1,
  f1_s7_5_2=long2,
  f1_s7_5_3=long3,
  f1_s7_6_1=talla1,
  f1_s7_6_2=talla2,
  f1_s7_6_3=talla3,
  upm=idsector,
  area=area,
  fexp=pw) %>%
mutate(estrato=area) %>%
filter(!is.na(fexp))

} else {
  if (año==2014){
    library("haven")
    bdd <- read_sav(paste0(dir,"/ECV6R_PERSONAS.SAV"),
      col_select=c(
        "PS80C", #Fecha de nacimiento: año
        "PS80B", #Fecha de nacimiento: mes

```

```

      "PS80A",      #Fecha de nacimiento: día
      "PS81C",      #Año - medición
      "PS81B",      #Mes - medición
      "PS81A",      #Día - medición
      "PS82",        #Peso 1
      "PS82A",       #Peso 2
      "PS82B",       #Peso 3
      "PS83",        #Longitud 1
      "PS83A",       #Longitud 2
      "PS83B",       #Longitud 3
      "PS84",        #Talla 1
      "PS84A",       #Talla 2
      "PS84B",       #Talla 3
      "SEXO",        #Sexo de la niña/o
      "FEXP",        #Factor de Expansión
      "IDENTIF_SECT", #Unidad Primaria de Muestreo
      "PROVINCIA",
      "PD18",        #Autoidentificación
      "AREA_5000"
    )) %>%

```

```

mutate(across(c(PS80A, PS80B, PS80C,
                PS81A, PS81B, PS81C,
                PS82, PS82A, PS82B,
                PS84, PS84A, PS84B), ~na_if(., -1))) %>%

```

```

rename( #Cambio de nombres a versión Ensanut 2018

```

```

  f1_s7_2_3=PS80C,
  f1_s7_2_2=PS80B,
  f1_s7_2_1=PS80A,
  f1_s7_3_3=PS81C,
  f1_s7_3_2=PS81B,
  f1_s7_3_1=PS81A,
  f1_s7_4_1=PS82,
  f1_s7_4_2=PS82A,
  f1_s7_4_3=PS82B,
  f1_s7_5_1=PS83,
  f1_s7_5_2=PS83A,
  f1_s7_5_3=PS83B,
  f1_s7_6_1=PS84,
  f1_s7_6_2=PS84A,
  f1_s7_6_3=PS84B,
  prov=PROVINCIA,
  sexo=SEXO,
  fexp=FEXP,
  upm=IDENTIF_SECT,
  estrato=AREA_5000,
  f1_s2_9=PD18

```

```

) %>%
mutate(area=estrato,
        across(where(is.double),as.numeric)
)

```

```

} else {

```

```

if (año==2018){
  library("readstata13")
  bdd <- read.dta13(paste0(dir,"/1_BDD_ENS",año,"_f1_personas.dta"),
    convert.factors = FALSE,
    select.cols = c(
      "f1_s7_2_3", #Fecha de nacimiento: año
      "f1_s7_2_2", #Fecha de nacimiento: mes
      "f1_s7_2_1", #Fecha de nacimiento: día
      "f1_s7_3_3", #Fecha de la entrevista/encuesta: año
      "f1_s7_3_2", #Fecha de la entrevista/encuesta: mes
      "f1_s7_3_1", #Fecha de la entrevista/encuesta: día
      "f1_s7_4_1", #Peso 1
      "f1_s7_4_2", #Peso 2
      "f1_s7_4_3", #Peso 3
      "f1_s7_5_1", #Longitud 1
      "f1_s7_5_2", #Longitud 2
      "f1_s7_5_3", #Longitud 3
      "f1_s7_6_1", #Talla 1
      "f1_s7_6_2", #Talla 2
      "f1_s7_6_3", #Talla 3
      "sexo",      #Sexo de la niña/o
      "fexp",      #Factor de Expansión
      "upm",       #Unidad Primaria de Muestreo
      "estrato",
      "area",
      "prov",
      "f1_s2_9" #Autoidentificación
    ))
  # hog <- read.dta13(paste0(dir,"/2_BDD_ENS",año,"_f1_hogar.dta"),
  #                   convert.factors = FALSE)
}
else {
  if (año>=2022){
    print("consultar la sintaxis de cálculo de la ENDI")
  }
  else{
    print("No existe información para este año")
  }
}
}
}

#=====#
####  Cálculo de variables antropométricas necesarias para el indicador  ####
#=====#

# Estimación de la edad en días -----#
bdd <- bdd %>%
  mutate(dob = paste(f1_s7_2_3, f1_s7_2_2, f1_s7_2_1)) %>%
  mutate(dov = paste(f1_s7_3_3, f1_s7_3_2, f1_s7_3_1)) %>%
  mutate(dob = as_date(dob)) %>%
  mutate(dov = as_date(dov)) %>%

```

```

mutate(edaddias = (dob %--% dov) / days(1))

#----- Estimación del peso (kg) -----#

### Validación de las 3 medidas del peso

bdd <- bdd %>%
  mutate(
    f1_s7_4_3 = case_when(
      abs(f1_s7_4_1 - f1_s7_4_2) <= 0.5 & !is.na(f1_s7_4_3) ~ NA_real_,
      TRUE ~ f1_s7_4_3))

### Se calcula el peso en kg
## Distancia entre las tres medidas
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    d1 = abs(f1_s7_4_1 - f1_s7_4_2),
    d2 = abs(f1_s7_4_1 - f1_s7_4_3),
    d3 = abs(f1_s7_4_2 - f1_s7_4_3))

## Promedio simple entre toma 1 y toma 2
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    peso = case_when(
      d1 <= 0.5 ~ ((f1_s7_4_1 + f1_s7_4_2) / 2),
      TRUE ~ NA_real_))

## Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
## Distancia mínima
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    dmin = case_when(
      (d1 <= d2 & d1 <= d3) | (!is.na(d1) & is.na(d2) & is.na(d3)) ~ d1,
      (d2 <= d1 & d2 <= d3) | (!is.na(d2) & is.na(d1) & is.na(d3)) ~ d2,
      (d3 <= d1 & d3 <= d2) | (!is.na(d3) & is.na(d1) & is.na(d2)) ~ d3,
      TRUE ~ NA_real_),
    peso = case_when(
      d3 == dmin ~ (f1_s7_4_2 + f1_s7_4_3) / 2,
      d2 == dmin ~ (f1_s7_4_1 + f1_s7_4_3) / 2,
      d1 == dmin ~ (f1_s7_4_1 + f1_s7_4_2) / 2,
      TRUE ~ peso))

#----- Estimación de la talla (cm) -----#

### Validación de las 3 medidas de la longitud
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    f1_s7_5_3 = as.numeric(f1_s7_5_3),
    f1_s7_5_3 = case_when(
      abs(f1_s7_5_1 - f1_s7_5_2) <= 0.5 & !is.na(f1_s7_5_3) ~ NA_real_,
      TRUE ~ f1_s7_5_3))

```

```

#### Validación de las 3 medidas de la talla
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    f1_s7_6_3 = case_when(
      abs(f1_s7_6_1 - f1_s7_6_2) <= 0.5 & !is.na(f1_s7_6_3) ~ NA_real_,
      TRUE ~ f1_s7_6_3))

### Se calcula la talla en cm.
## Consolido las tomas para longitud y talla

# Talla 1
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    talla1 = case_when(
      is.na(f1_s7_5_1) & !is.na(f1_s7_6_1) ~ f1_s7_6_1,
      !is.na(f1_s7_5_1) & is.na(f1_s7_6_1) ~ f1_s7_5_1,
      TRUE ~ NA_real_))

# Talla 2
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    talla2 = case_when(
      is.na(f1_s7_5_2) & !is.na(f1_s7_6_2) ~ f1_s7_6_2,
      !is.na(f1_s7_5_2) & is.na(f1_s7_6_2) ~ f1_s7_5_2,
      TRUE ~ NA_real_))

# Talla 3
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    talla3 = case_when(
      is.na(f1_s7_5_3) & !is.na(f1_s7_6_3) ~ f1_s7_6_3,
      !is.na(f1_s7_5_3) & is.na(f1_s7_6_3) ~ f1_s7_5_3,
      TRUE ~ NA_real_))

## Distancia entre las tres medidas
bdd <- bdd %>%
  mutate(d1_tal = abs(talla1 - talla2),
    d2_tal = abs(talla1 - talla3),
    d3_tal = abs(talla2 - talla3))

## Promedio simple entre toma 1 y toma 2
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    talla = case_when(
      d1_tal <= 0.5 ~ ((talla1 + talla2) / 2),
      TRUE ~ NA_real_))

## Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
## Distancia mínima
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    dmin_tal = case_when(

```

```
(d1_tal <= d2_tal & d1_tal <= d3_tal) | (!is.na(d1_tal) & is.na(d2_tal) & is.na(d3_tal)) ~ d1_tal,
(d2_tal <= d1_tal & d2_tal <= d3_tal) | (!is.na(d2_tal) & is.na(d1_tal) & is.na(d3_tal)) ~ d2_tal,
(d3_tal <= d1_tal & d3_tal <= d2_tal) | (!is.na(d3_tal) & is.na(d1_tal) & is.na(d2_tal)) ~ d3_tal,
TRUE ~ NA_real_),
talla = case_when(
  d3_tal == dmin_tal ~ (talla2 + talla3) / 2,
  d2_tal == dmin_tal ~ (talla1 + talla3) / 2,
  d1_tal == dmin_tal ~ (talla1 + talla2) / 2,
  TRUE ~ talla))
```

```
#=====#
####      Cálculo de puntuaciones z de antropometría infantil      ####
#=====#
```

```
### Calculate height-for-age (zlen)
```

```
bdd <- data.frame(bdd,with(
  bdd,
  anthro_zscores(
    sex = sexo,
    age = edaddias,
    weight = peso,
    lenhei = talla
  )
))
```

```
#=====#
####      Construcción de las variables de desnutrición con los z-score      ####
#=====#
```

```
# Definición de la edad en días de la población menor a 5 años:
# Días = 365.25 * 5 = 1826.25 ----> 1826 (valor aproximado) (Manual Anthro OMS)
```

```
#-----# Desnutrición crónica para menores de 5 años de edad -----#
```

```
### Cálculo del indicador
```

```
bdd <- bdd %>%
  mutate(
    dcronica = case_when(
      (zlen >= -6 & zlen < -2) & (edaddias < 1826 & !is.na(edaddias)) ~ 1,
      (zlen >= -2 & zlen <= 6) & (edaddias < 1826 & !is.na(edaddias)) ~ 0,
      TRUE ~ NA_real_))
```

```
# Tabulados -----
```

```
# Desagregaciones
```

```
bdd <- bdd %>% mutate(
  Nacional = if_else(!is.na(dcronica),1,NA_real_),
  Área = area,
  Sexo = sexo,
  Provincia=if_else(as.numeric(prov)==90, NA_real_, as.numeric(prov))
)
```

```

if (año==2012) {
  bdd <- bdd %>% mutate(Autoidentificación = if_else(gr_etn==4, 6, gr_etn))
} else {
  bdd <- bdd %>% mutate(
    Autoidentificación =
      case_when(
        f1_s2_9 == 1 ~ 1,
        f1_s2_9 == 2 | f1_s2_9 == 3 | f1_s2_9 == 4 ~ 2,
        f1_s2_9 == 5 ~ 3,
        f1_s2_9 == 6 ~ 4,
        f1_s2_9 == 7 | f1_s2_9 == 8 ~ 5,
        T ~ NA_real_
      )
  )
}

Desagregaciones <- c("Nacional", "Área", "Sexo", "Autoidentificación", "Provincia")

# Diseño Muestral

bdd <- bdd %>%
  as_survey_design(
    ids = upm,
    strata = estrato,
    weights = fexp,
    nest = T
  )

options(survey.lonely.psu = "adjust")

D_Cronica <- Desagregaciones %>%
  map_dfr(
    ~ bind_rows((bdd %>%
      filter(!is.na(!sym(.x))) %>%
      group_by(!sym(.x)) %>%
      summarize(PDC_0a5 = survey_mean(dcronica, na.rm = T))) %>%
    mutate(Indicador = .x, Categorías = !sym(.x)) %>%
    select(-.x)
  )

D_Cronica <- D_Cronica %>%
  mutate(
    Categorías =
      case_when(
        Indicador == "Nacional" ~ "Nacional",
        Indicador == "Área" & Categorías == 1 ~ "Urbana",
        Indicador == "Área" & Categorías == 2 ~ "Rural",
        Indicador == "Sexo" & Categorías == 1 ~ "Hombre",
        Indicador == "Sexo" & Categorías == 2 ~ "Mujer",
        Indicador == "Autoidentificación" & Categorías == 1 ~ "Indígena",
        Indicador == "Autoidentificación" & Categorías == 2 ~ "Afroecuatoriano/a",
        Indicador == "Autoidentificación" & Categorías == 3 ~ "Montubio/a",

```

```

Indicador == "Autoidentificación" & Categorías == 4 ~ "Mestizo/a",
Indicador == "Autoidentificación" & Categorías == 5 ~ "Blanco/a y otros",
Indicador == "Autoidentificación" & Categorías == 6 ~ "Resto de la Población",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 1 ~ "Azúay",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 2 ~ "Bolívar",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 3 ~ "Cañar",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 4 ~ "Carchi",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 5 ~ "Cotopaxi",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 6 ~ "Chimborazo",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 7 ~ "El Oro",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 8 ~ "Esmeraldas",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 9 ~ "Guayas",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 10 ~ "Imbabura",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 11 ~ "Loja",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 12 ~ "Los Ríos",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 13 ~ "Manabí",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 14 ~ "Morona Santiago",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 15 ~ "Napo",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 16 ~ "Pastaza",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 17 ~ "Pichincha",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 18 ~ "Tungurahua",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 19 ~ "Zamora Chinchipe",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 20 ~ "Galápagos",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 21 ~ "Sucumbíos",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 22 ~ "Orellana",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 23 ~ "Santo Domingo de los Tsáchilas",
Indicador == "Provincia" & Categorías == 24 ~ "Santa Elena",
T ~ NA_character_
)
) %>%
select("Indicador", "Categorías", "PDC_0a5") %>%
mutate(across(where(is.numeric), ~ .x * 100))

view(D_Cronica)

```