

FICHA METODOLÓGICA

| | |
|-----------------------------|--|
| NOMBRE DEL INDICADOR | Prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años ¹ |
| DEFINICIÓN | Número de niños y niñas menores de cinco años de edad que presentan un retraso en la longitud/talla, en relación a los estándares esperados para su edad de acuerdo a los Patrones de Crecimiento Infantil establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); expresado como porcentaje de niños y niñas menores de cinco años. |

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$DC_{<5} = \frac{NDC_{<5}}{NT_{<5}} * K$$

Donde:

$DC_{<5}$ = Prevalencia de la desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años en el periodo determinado (t).

$NDC_{<5}$ = Número de niños menores de cinco años de edad que presentan desnutrición crónica en un año o periodo determinado (t).

$NT_{<5}$ = Total de niños y niñas menores de cinco años en el periodo determinado (t).

$K = 100$

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS

Desnutrición.- Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. (*Glosario de Términos de Desnutrición-UNICEF, 2012*)

Desnutrición Crónica.- La desnutrición crónica se ve reflejada en el crecimiento alcanzado en longitud o talla para la edad del niño en una visita determinada. El retardo en el crecimiento de los niños conocido como desnutrición crónica, (longitud o talla baja) se debe a un prolongado aporte insuficiente de nutrientes o enfermedades infecciosas recurrentes. *Patrones de Crecimiento para el niño- OMS, 2008; pág.3*)

Longitud o Talla Es la medida que refleja la estatura o altura de las personas. Para todos los indicadores que incluyen longitud o talla, longitud acostada debe ser usada para niños menores de 24 meses y talla parada, para niños de 24 meses y mayores. El indicador de desnutrición crónica se mide en centímetros (cm). (*Manual del ANTHRO- OMS, 2007*)

¹ La Comisión Especial de Estadísticas de Salud, mediante reunión mantenida, el día jueves 07 de mayo de 2015, resolvió a partir del acuerdo CEES 006-2015, aprobar la metodología de cálculo del indicador de la tasa de desnutrición en sus diferentes tipos: crónica, aguda y global.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición 2012 y 2018 (ENSANUT 2012 y 2018), así como la Encuesta de Condiciones de Vida 2014 (ECV 2014) son los instrumentos estadísticos utilizados para dar cuenta de este indicador.

Este indicador se obtiene de dividir el número de personas menores a 5 años de edad que tienen desnutrición crónica en un año o periodo determinado (t) entre la población del mismo grupo de edad en un año o periodo determinado (t), multiplicado por cien.

A partir de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018), sección "antropometría" se obtiene la desnutrición crónica de la siguiente manera:

- Para la toma del peso, longitud y talla se usan dos mediciones y en el caso de haber una diferencia de ± 0.5 kg para peso y ± 0.5 cm para talla, se toma una tercera medición. El valor final es la media entre las dos mediciones. En caso de haber una tercera medición, esta representa la media de las dos mediciones más cercanas.
- Una vez que se tienen calculadas las variables edad en días, peso, longitud y talla se procede a estandarizar los valores longitud o talla para la edad, peso para la longitud o talla y peso para la edad en base al Manual Anthro (OMS-2007; pág. 20-24) y a las tablas de patrones de crecimiento de la OMS. (OMS-2006; Child Growth Standards)².
- Para el cálculo de la desnutrición crónica se toma, exclusivamente, la variable estandarizada de longitud o talla para la edad. En este sentido, las personas menores de 5 años de edad con retardo en talla son registradas como las que tienen un puntaje estandarizado menor a -2.0 desviaciones estándar. En este procedimiento se corrigen los valores extremos para este indicador; así se eliminan los valores que están fuera del intervalo -6.0 y +6.0 desviaciones estándar. (Tabla 1.)

Tabla 1. Valores plausibles de los indicadores antropométricos en niños menores de 5 años de edad

| Indicador | Criterios o variables antropométricas | Puntajes Z |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Desnutrición Crónica | Longitud o talla para la edad | -6.0 y +6.0 |
| Desnutrición Global | Peso para la edad | -6.0 y +5.0 |
| Desnutrición Aguda | Peso para la talla/longitud | -5.0 y +5.0 |

Fuente: OMS, 2006

- Para el cálculo del indicador de desnutrición crónica se toma en cuanto los puntajes estandarizados para las personas menores de 5 años o 4 años de edad cumplidos, edad que corresponde a 59 meses. Según el Manual Anthro de la OMS, 59 meses equivalen a 1.826 días.

² Se debe definir para cada observación si la medida es longitud o talla, en el caso que no esté especificado en la base de datos.

OF
CR
A.R

| LIMITACIONES TÉCNICAS | | |
|--|--|--|
| En encuestas previas a la ENSANUT 2012, únicamente se registraba una sola medición para la longitud/ talla y para el peso, por lo tanto no se puede aplicar la metodología de las tres mediciones que se emplean para ENSANUT 2012 o ECV 2014. | | |
| UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL INDICADOR | Porcentaje | |
| INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR | Por cada 100 niños/as menores de 5 años de edad se estiman XX niños con desnutrición crónica en el periodo determinado. | |
| FUENTE DE DATOS | <p>Las fuentes oficiales que pueden ser empleadas para estimación del indicador son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta Demográfica y de Salud Materna Infantil (2004). • Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012). • Encuesta de Condiciones de Vida (2014). • Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018). <p>No obstante, la fuente principal a partir de la cual se calculan los indicadores de desnutrición es:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. | |
| PERIODICIDAD DEL INDICADOR | Cuatrienal. | |
| DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS | 2012, 2014 y 2018 | |
| CONSEJO SECTORIAL Y/O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN | Consejo Sectorial de lo Social - Ministerio de Salud Pública (MSP). ³ | |
| FECHAS DE TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN | En función de la publicación de la Encuesta de Salud y Nutrición y otras fuentes de información que recolecten variables antropométricas. | |
| NIVEL DE DESAGREGACIÓN | GEOGRÁFICO | Nacional, urbano, rural, zonas de planificación y provincial. ⁴ |
| | GENERAL | No aplica. |

³En atención a los procesos de reestructura de la Administración Pública, aquellas entidades que asuman las competencias de las registradas como responsables, asumirán las responsabilidades en cuanto al reporte de este indicador.

⁴ Los demás niveles de desagregación, estarán en función al procesamiento de la información, y a los resultados obtenidos en la aplicación de los parámetros establecidos por el INEC, de acuerdo a los documentos técnicos emitidos según la operación estadística pertinente.


 CB
 A.R.
 JHR

| | | |
|--|----------------------|--|
| | OTROS ÁMBITOS | No aplica. |
| INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA | | No aplica |
| RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | | <p><u>Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021</u></p> <p>Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.</p> <p>Meta: Reducir de 23,9% al 13,2% la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, al 2021</p> <p><u>Agenda de Desarrollo 2030- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).</u></p> <p>Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.</p> <p>Meta 2.2: Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad</p> <p>Indicador 2.2.1: Prevalencia del retraso en el crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años</p> |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR | | <p>Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) “Glosario de Términos de Desnutrición”.</p> <p>Organización Mundial de la Salud (OMS 2008) “Patrones de Crecimiento para el niño”.</p> <p>Organización Mundial de la Salud (OMS 2007) “Manual WHO Anthro para computadoras personales” Software para evaluar el crecimiento y desarrollo de los niños del mundo.</p> <p>Organización Mundial de la Salud (OMS 2006) “Child Growth Standars”</p> |

| | | |
|--|---|-----|
| | Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012) "Encuesta Nacional de Salud y Nutrición" ENSANUT 2012 Tomo I. | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA METODOLÓGICA | 08/05/2014. | |
| FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA | 03/02/2020 | |
| CLASIFICADOR TEMÁTICO ESTADÍSTICO | Salud | 1.4 |
| HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR | Homologado | |
| FECHA DE HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR | 28/08/2017 | |
| RESEÑA DEL INDICADOR | Indicador homologado en Comisión Especial de Estadísticas de Salud el 14 de septiembre de 2016 con resolución CEES 010-2016 | |
| ELABORADO POR | Dirección de Estadísticas Socio Demográficas- Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aprobado: Mesa Temática de Salud | |

ANEXOS

Anexo 1. Algoritmo del Cálculo del Indicador

SINTAXIS

```

*=====
* TÍTULO DE LA SINTAXIS:
* Estimación de la tasa de desnutrición crónica
* OPERACIÓN ESTADÍSTICA:
* Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2012)
* UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE:
* Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas (DIES)
* ENTIDAD EJECUTORA:
* Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

```


 C.B.
 A.P.
 J.M.

```

*=====
* Fecha de elaboración:      Abril   del 2015
*
* Fecha última modificación: Mayo   del 2015
*=====
* Elaborado por:
*
* José Andrade
*
* Analista de la Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas (DIES)
* josecarlos_andrade@inec.gob.ec
*=====
* Revisado y Aprobado por:
*
* Roberto Castillo
*
* Coordinador de Innovación en Métricas y Análisis de la Información
* roberto_castillo@inec.gob.ec
*
* Andrés Albán
*
* Director de Estadísticas Sociales y Demográficas (DIES)
* andres_alban@inec.gob.ec
*=====
*
*=====
* Instrucciones:
* 1. Descargar las bases que tengan las variables antropométricas en formato.dta
* 2. Guardar en un directorio y copiar ese directorio en "cd"
* 3. Correr la programación en stata
* 4. Es necesario que exista conexión a internet para descargar el paquete
*    Child growth standards "igrowup_stata".
*=====
clear all
set more off
cd "." // Dirección de las bases ENSANUT 2012

use ensanut_f10_antropometria, clear
svyset idsector [pweight=pw], strata (area)
*=====
* Preparación de base
*=====
merge 1:1 idpers using ensanut_f1_personas.dta, ///
keepusing (pd04a pd04b pd04c dia mes anio subreg provincia ///
gr_etn area pd00 nbi quint subreg zonas_planificacion idmadre)
drop if _merge ==2
drop _merge

*=====
* Tratamiento de los inputs
*=====
* Missing value para no respuesta
loc variables "peso1 peso2 peso3 long1 long2 long3 talla1 talla2 talla3"
loc lim: word count `variables'
forvalues i = 1/`lim' {

```

```

loc a : word `i' of `variables'
replace `a' =. if inlist(`a',999)
}
* Imputo el dato aberrante al valor medio (15)
*replace pd04a = 15 if x==1
*replace dia = 15 if y==1

*-----*

* 1.- Estimación de la edad (días)
cap drop edad
* Fecha de nacimiento
gen dob=mdy(pd04b, pd04a, pd04c)
* Fecha de medición
gen dov=mdy(mes,dia,anio)
* Edad en días
gen edad= dov-dob

* 2.- Estimación del peso (kg)
gen peso=.
* Distancia entre las tres medidas
gen d1 = abs(peso1- peso2)
gen d2 = abs(peso1- peso3)
gen d3 = abs(peso2- peso3)
* Variable identificador si distancia entre toma 1 y toma 2 menor o igual a 0.5
gen s = 0 if peso1!=.
replace s = 1 if d1 <= 0.5
* Promedio simple entre toma 1 y toma 2
replace peso =(peso1+peso2)/2 if s==1
* Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
* distancia mínima
gen dmin= min(d1,d2,d3)
replace peso = (peso1 +peso2)/2 if d1==dmin
replace peso = (peso1 +peso3)/2 if d2==dmin
replace peso = (peso2 +peso3)/2 if d3==dmin
drop d1 d2 d3 s dmin

* 3.- Estimación de la talla (cm)
gen talla =.
* Consolido las tomas para longitug y talla
egen talla1_1 = rowtotal(long1 talla1), missing
egen talla2_2 = rowtotal(long2 talla2), missing
egen talla3_3 = rowtotal(long3 talla3), missing
* Distancia entre las tres medidas
gen d1 = abs(talla1_1- talla2_2)
gen d2 = abs(talla1_1- talla3_3)
gen d3 = abs(talla2_2- talla3_3)
* Variable identificador si distancia entre toma 1 y toma 2 menor o igual a 0.5
gen s = 0 if talla1_1 !=.
replace s = 1 if d1 <= 0.5
* Promedio simple entre toma 1 y toma 2
replace talla =(talla1_1+talla2_2)/2 if s==1
* Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
* distancia mínima

```


 CB
 A.R.
 JLP

```

gen dmin= min(d1,d2,d3)
replace talla = (talla1_1+talla2_2)/2 if d1==dmin
replace talla = (talla1_1+talla3_3)/2 if d2==dmin
replace talla = (talla2_2+talla3_3)/2 if d3==dmin
drop d1 d2 d3 s dmin

*=====
*Crear un nuevo directorio (igrowup)
loc y ="" // Dirección de las tablas de referencia WHO 2007
cap mkdir "`y'"
cd "`y'"
*Cálculo de indicadores de antropometria (igrowup)
adopath + "`y'"
*Generate the first three parameters reflib, datalib & datalab
gen str200 reflib="`y'"
lab var reflib "Directory of reference tables"
gen str200 datalib="`y'"
lab var datalib "Directory for datafiles"
gen str30 datalab="ecv14"
lab var datalab "Working file"

* Se generan las variables
gen gender=f10sexo
gen agemons=edad
gen str6 ageunit="days"
lab var ageunit "days"
gen weight=peso
gen height=talla
gen str1 measure=" "
gen headc=.
gen muac=.
gen triskin=.
gen subskin=.
gen sub=.
gen str1 oedema="n"
gen sw=-1
/* Fill in the macro parameters to run the command */
igrowup_standard reflib datalib datalab gender agemons ///
  ageunit weight height measure head muac tri sub oedema sw

*=====
* Construcción de las variables de desnutrición con los zscore
*=====
** Dias= 365.25 * 5 = 1826.25 (según Manual Anthro OMS)

* 1. Desnutrición Crónica
gen dcronica=0
replace dcronica=1 if (_zlen!=. & agemons<1826 & _zlen< -2)
replace dcronica=. if (agemons>=1826)
replace dcronica=. if _zlen==.

svy: mean dcronica if agemons<1826 & _zlen!=. & _zlen>=-6 & _zlen<=6

```


 CB
 A.R.

```

===== FIN =====
*
*=====
* TÍTULO DE LA SINTAXIS:
* Prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años
* OPERACIÓN ESTADÍSTICA:
* Encuesta de Condiciones de Vida (ECV - 2014)
* UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE:
* Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
*=====
*****
*** Desnutrición ECV 2014 ***
*****
clear all
set more off
cd "D:\Desnutricion"

use personas1, clear
destring identif_sect, replace
svyset identif_sect [pw=fexp], strata(dominio) vce(linearized) singleunit(scaled)

* Edad en días *****
replace ps80a=. if ps80a==-1
gen dob=mdy(ps80b,ps80a,ps80c)
gen dov=mdy(ps81b,ps81a,ps81c)
gen edaddias= dov- dob
* Edad en años
gen edadanio=edaddias/30/12

* Peso *****
gen peso=.
*Umbral de inclusion medida 1 y 2 :
replace peso=(ps82+ps82a)/2 if ps82-ps82a<0.5
*Media de los 2 valores mas cercanos
replace peso=abs(ps82+ps82a)/2 if (abs(ps82-ps82a)<abs(ps82-ps82b)) ///
& (abs(ps82-ps82a)<abs(ps82a-ps82b))
replace peso=abs(ps82+ps82b)/2 if (abs(ps82-ps82b)<abs(ps82-ps82a)) ///
& (abs(ps82-ps82b)<abs(ps82a-ps82b))
replace peso=abs(ps82a+ps82b)/2 if (abs(ps82a-ps82b)<abs(ps82-ps82a)) ///
& (abs(ps82a-ps82b)<abs(ps82-ps82b))
*Coreccion missings
replace peso=. if peso==-1

* Talla *****
gen tallaf=.
*Umbral de inclusion medida 1 y 2 :
replace tallaf=(ps84+ps84a)/2 if ps84-ps84a<0.5
*Media de los 2 valores mas cercanos
replace tallaf=abs(ps84+ps84a)/2 ///
if (abs(ps84-ps84a)<abs(ps84-ps84b)) & ///

```


 CB
 A.R.
 JH

```

(abs(ps84-ps84a)<abs(ps84a-ps84b))
replace tallaf=abs(ps84+ps84b)/2 ///
  if (abs(ps84-ps84b)<abs(ps84-ps84a)) & ///
    (abs(ps84-ps84b)<abs(ps84a-ps84b))
replace tallaf=abs(ps84a+ps84b)/2 ///
  if (abs(ps84a-ps84b)<abs(ps84-ps84a)) & ///
    (abs(ps84a-ps84b)<abs(ps84-ps84b))
*Coreccion missings
replace tallaf=. if tallaf==-1

* Longitud *****
gen longf=.
*Umbral de inclusion medida 1 y 2 :
replace longf=(ps83+ps83a)/2 if ps83-ps83a<0.5
*Media de los 2 valores mas cercanos
replace longf=abs(ps83+ps83a)/2 if (abs(ps83-ps83a)<abs(ps83-ps83b)) ///
  & (abs(ps83-ps83a)<abs(ps83a-ps83b))
replace longf=abs(ps83+ps83b)/2 if (abs(ps83-ps83b)<abs(ps83-ps83a)) ///
  & (abs(ps83-ps83b)<abs(ps83a-ps83b))
replace longf=abs(ps83a+ps83b)/2 if (abs(ps83a-ps83b)<abs(ps83-ps83a)) ///
  & (abs(ps83a-ps83b)<abs(ps83-ps83b))
*Coreccion missings
replace longf=. if longf==-1

* Talla y longitud *****
gen talla=longf
replace talla=tallaf if edad>=2

*****
*****igrowup_standard.ado*****
*Crear un nuevo directorio "igrowup":
local y ="D:\Desnutricion\igrowup"
cap mkdir "`y'"
cd "`y'"
*Calculo de indicadores de antropometria (igrowup):
adopath + "`y'"
*Generate the first three parameters reflib, datalib & datalab
gen str200 reflib="`y'"
lab var reflib "Directory of reference tables"
gen str200 datalib="`y'"
lab var datalib "Directory for datafiles"
gen str30 datalab="ensanut"
lab var datalab "Working file"

* Se generan las variables
gen gender=sexo
gen agemons=edaddias
gen str6 ageunit="days"
lab var ageunit "days"
gen weight=peso
gen height=talla
gen str1 measure=" "
gen headc=.
gen muac=.

```

Handwritten signature and initials:

 C.P. A.P.

```

gen triskin=.
gen subskin=.
gen sub=.
gen str1 oedema="n"
gen sw=-1
/*      Fill in the macro parameters to run the command */
igrowup_standard reflib datalib datalab gender agemons ///
    ageunit weight height measure head muac tri sub oedema sw

*****
*** Construcción de las variables de desnutrición con los zscore ***
*****
*** Dias= 365.25 * 5 = 1826.25 (según Manual Anthro OMS)
* 1. Desnutrición Crónica
gen dcronica=0
replace dcronica=1 if (_zlen!=. & agemons<1826 & _zlen< -2)
replace dcronica=. if (agemons>=1826)
replace dcronica=. if _zlen==.

* 2. Desnutrición Global
gen dglobal=0
replace dglobal=1 if (_zwei!=. & agemons<1826 & _zwei<-2)
replace dglobal=. if (agemons>=1826)
replace dglobal=. if _zwei==.

* 3. Desnutrición aguda
gen daguda=0
replace daguda=1 if (_zwfl!=. & agemons<1826 & _zwfl<-2)
replace daguda=. if (agemons>=1826)
replace daguda=. if _zwfl==.

*****
*** Resultados con los rangos de los zscore ***
*****
*** Población menor a 60 meses y se corrige por outliers
svy: mean dcronica if agemons<1826 & _zlen!=. & _zlen>=-6 & _zlen<=6
svy: mean dglobal if agemons<1826 & _zwei!=. & _zwei>=-6 & _zwei<=5
svy: mean daguda if agemons<1826 & _zwfl!=. & _zwfl>=-5 & _zwfl<=5

*===== FIN =====*

*=====*
* TÍTULO DE LA SINTAXIS:
* Prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años
* OPERACIÓN ESTADÍSTICA:
* Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT - 2018)
* UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE:
* Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
*=====*
* Fecha de elaboración: Diciembre del 2018

```


 C.B.
 A.R.
 July

```

* Fecha última modificación: Diciembre del 2018

*=====
*=====
* Instrucciones:
* 1. Descargar las bases que tengan las variables antropometricas en formato .dta
* 2. Guardar en un directorio y copiar ese directorio en "cd"
* 3. Correr la programación en stata
* 4. Es necesario que exista conexión a internet para descargar el paquete
*     Child growth standards "igrowup_stata".

* Nota: En las bases oficiales publicadas por el INEC, la base de datos:
"1_BDD_ENS2018_f1_personas.dat" contiene como variable "dcronica", etiquetada
como "Desnutrición crónica menores de 5 años", misma que se ha construido
utilizando esta sintaxis, por lo que el usuario podría utilizar directamente esta
variable construida oficialmente para obtener el indicador con sus respectivas
desagregaciones.
*=====
clear all
set more off
* En esta sección se copia la dirección en donde se encuentran las bases de datos
* que contienen las variables de antropometría (Ej: cd "C:\...")
cd "C:\ENSANUT 2018\Bases de datos\Bases_trabajadas"
global dir2 = "C:\Desnutricion\igrowup"
global dir3 = "C:\sobrepeso\Who2007"
global dirr = "C:\ENSANUT 2018\Resultados"

use 1_BDD_ENS2018_f1_personas, clear

merge m:1 id_hogar using 2_BDD_ENS2018_f1_hogar
keep if _merge==3
drop _merge

svyset upm [iw=fexp], strata(estrato) vce(linearized) singleunit(certainty)

*=====
* Cálculo de variables antropométricas necesarias para el indicador
*=====
*** 1.- Estimación de la edad (días)
cap drop edaddias
** Fecha de nacimiento
gen dob=mdy(f1_s7_2_2,f1_s7_2_1,f1_s7_2_3)
** Fecha de medición
gen dov=mdy(f1_s7_3_2,f1_s7_3_1,f1_s7_3_3)
** Edad en días
gen edaddias= dov-dob

*** 2.- Estimación del peso (kg)
* Validación de las 3 medidas del peso
gen aux = f1_s7_4_1 - f1_s7_4_2
replace aux = aux*-1 if aux<0
replace f1_s7_4_3=. if aux<=0.5 & f1_s7_4_3!=.
drop aux

* Se calcula el peso en kg.
gen peso=.
* Distancia entre las tres medidas
gen d1 = abs(f1_s7_4_1 - f1_s7_4_2)
gen d2 = abs(f1_s7_4_1 - f1_s7_4_3)
gen d3 = abs(f1_s7_4_2 - f1_s7_4_3)
* Variable identificador si distancia entre toma 1 y toma 2 menor o igual a 0.5

```

```

gen s = 0 if f1_s7_4_1!=.
replace s = 1 if d1 <= 0.5
* Promedio simple entre toma 1 y toma 2
replace peso = (f1_s7_4_1+f1_s7_4_2)/2 if s==1
* Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
* distancia mínima
gen dmin= min(d1,d2,d3)
replace peso = (f1_s7_4_1 + f1_s7_4_2)/2 if d1==dmin
replace peso = (f1_s7_4_1 + f1_s7_4_3)/2 if d2==dmin
replace peso = (f1_s7_4_2 + f1_s7_4_3)/2 if d3==dmin
drop d1 d2 d3 s dmin

*** 3.- Estimación de la talla (cm)
* Validación de las 3 medidas de la longitud
gen aux = f1_s7_5_1 - f1_s7_5_2
replace aux = aux*-1 if aux<0
replace f1_s7_5_3=. if aux<=0.5 & f1_s7_5_3!=.
drop aux
* Validación de las 3 medidas de la talla
gen aux = f1_s7_6_1 - f1_s7_6_2
replace aux = aux*-1 if aux<0
replace f1_s7_6_3=. if aux<=0.5 & f1_s7_6_3!=.
drop aux

* Se calcula la talla en cm.
gen talla =.
* Consolido las tomas para longitud y talla
egen talla1 = rowtotal(f1_s7_5_1 f1_s7_6_1), missing
egen talla2 = rowtotal(f1_s7_5_2 f1_s7_6_2), missing
egen talla3 = rowtotal(f1_s7_5_3 f1_s7_6_3), missing
* Distancia entre las tres medidas
gen d1 = abs(talla1- talla2)
gen d2 = abs(talla1- talla3)
gen d3 = abs(talla2- talla3)
* Variable identificador si distancia entre toma 1 y toma 2 menor o igual a 0.5
gen s = 0 if talla1 !=.
replace s = 1 if d1 <= 0.5
* Promedio simple entre toma 1 y toma 2
replace talla = (talla1+talla2)/2 if s==1
* Caso contrario, promedio de la menor distancia entre las 3 mediciones
* distancia mínima
gen dmin= min(d1,d2,d3)
replace talla = (talla1+talla2)/2 if d1==dmin
replace talla = (talla1+talla3)/2 if d2==dmin
replace talla = (talla2+talla3)/2 if d3==dmin
drop d1 d2 d3 s dmin

*** 4. Medida de talla o longitud
* H: Talla - L: Longitud
gen medida="H" if f1_s7_6_1!=.
replace medida="L" if f1_s7_5_1!=.

*=====
* Utilización del código de desnutrición de ANTHRO - OMS (igrowup)
*=====
*Crear un nuevo directorio "igrowup":
local y="$dir2"
cap mkdir "`y'"
cd "`y'"
adopath + "`y'"
*=====
* Nota: En caso de no contar con el paquete, a continuación se encuentran los

```


 CB
 A.R.
 JLP

```

códigos
* de descarga:
*Descarga y extracción del paquete de Child growth standards "igrowup_stata":
*cap copy http://www.who.int/childgrowth/software/igrowup_stata.zip ///
* igrowup_stata.zip
*cap unzipfile igrowup_stata.zip
*cd "`dir'"
=====
*Generar los tres primeros parámetros: reflib, datalib y datalab.
gen str200 reflib="`y'"
lab var reflib "Directory of reference tables"
gen str200 datalib="`y'"
lab var datalib "Directory for datafiles"
gen str30 datalab="fl_sn"
lab var datalab "Working file"

* Se generan las variables para la macro "igrowup".
gen sex=sexo
gen agemons=edaddias
gen str6 ageunit="days"
lab var ageunit "days"
gen weight=peso
gen height=talla
gen str1 measure=" "
gen headc=.
gen muac=.
gen triskin=.
gen subskin=.
gen sub=.
gen str1 oedema="n"
gen sw=-1

* Completar en la macro los parámetros para que corra el comando
igrowup_standard reflib datalib datalab sex agemons ///
ageunit weight height measure head muac tri sub oedema sw
drop reflib datalib datalab
=====
* Construcción de las variables de desnutrición con los zscore
** Definición de la edad en días de la población menor a 5 años:
** Dias= 365.25 * 5 = 1826.25 ----> 1826 (valor aproximado) (Manual Anthro OMS)
=====
* Cálculo para la población menor a 60 meses.
=====
* T7_il. Desnutrición crónica para menores de 5 años de edad
=====
cap drop dcronica
gen dcronica=0 if _zlen>=-6 & _zlen<=6 // no se consideran outliers.
replace dcronica=100 if (_zlen!=. & agemons<1826 & _zlen< -2) & _zlen>=-6 &
_zlen<=6
replace dcronica=. if (agemons>=1826)
replace dcronica=. if _zlen==.
rename dcronica T7_il

mean T7_il if agemons<1826 & _zlen!=. & _zlen>=-6 & _zlen<=6

===== FIN =====

```

AR

Anexo 2. Serie de datos del indicador: Prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años

| Desagregación | | ENSANUT | | ENSANUT |
|-----------------------|------------|---------|----------|---------|
| | | 2012 | ECV 2014 | 2018 |
| Nacional | | 25,29 | 23,89 | 23,01 |
| Área | Urbano | 21,80 | 19,66 | 20,05 |
| | Rural | 31,67 | 31,93 | 28,72 |
| Zona de planificación | Zona 1 | 25,69 | 25,71 | 23,78 |
| | Zona 2 | 23,41 | 26,99 | 23,72 |
| | Zona 3 | 39,54 | 36,64 | 33,24 |
| | Zona 4 | 19,65 | 18,42 | 22,15 |
| | Zona 5 | 25,80 | 22,70 | 23,45 |
| | Zona 6 | 31,44 | 33,76 | 29,36 |
| | Zona 7 | 23,06 | 19,95 | 20,16 |
| | Zona 8 | 20,89 | 15,91 | 16,70 |
| | Zona 9 | 21,45 | 25,46 | 21,35 |
| | Azuay | 31,03 | 31,51 | 28,79 |
| | Bolívar | 41,49 | 40,39 | 35,11 |
| | Cañar | 35,11 | 30,87 | 27,21 |
| | Carchi | 33,50 | 34,94 | 30,21 |
| | Cotopaxi | 34,95 | 33,98 | 31,80 |
| | Chimborazo | 49,47 | 43,74 | 35,21 |
| | Provincia | El Oro | 16,38 | 13,36 |
| Esmeraldas | | 18,27 | 21,72 | 18,46 |
| Guayas | | 22,16 | 16,72 | 17,74 |
| Imbabura | | 34,65 | 29,30 | 28,53 |
| Loja | | 30,52 | 27,54 | 23,43 |
| Los Ríos | | 16,82 | 17,29 | 19,61 |
| Manabí | | 20,89 | 19,07 | 22,85 |
| Morona Santiago | | 29,52 | 43,93 | 34,03 |
| Napo | | 27,88 | 29,71 | 27,87 |
| Pastaza | | 27,73 | 35,07 | 34,21 |
| Pichincha | | 22,29 | 25,88 | 20,97 |
| Tungurahua | | 34,42 | 33,31 | 32,48 |
| Zamora Chinchipe | | 24,61 | 31,05 | 24,51 |
| Galápagos | | 10,87 | 17,56 | 23,61 |
| Sucumbíos | | 18,07 | 25,61 | 26,87 |

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Orellana | 19,37 | 27,03 | 29,87 |
| Sto Domingo de los Tsáchilas | 16,15 | 16,23 | 19,88 |
| Santa Elena | 37,24 | 40,69 | 36,40 |

Instituciones Miembros de la Mesa Temática de Salud que sumillan la ficha metodológica y serie de datos del indicador: Prevalencia de desnutrición crónica en niños/as menores de cinco años

Nombre: Andrés Albón F.
Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC

Nombre: Carlos Peláez
Secretaría Técnica Planifica Ecuador- STPE

Nombre: Johanna Moro
Ministerio de Salud Pública- MSP

Nombre: Lenin Cadena Murillo
Gabinete Sectorial de lo Social-GSS

Nombre: Adriana Rodríguez.
Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida- STPTUV